

# “重要” よくお読みください

## 新型コロナワクチン接種のチェックリスト

### ワクチン接種の前日までにすること

- 新型コロナワクチン接種の予診票 (追加接種用) (接種券が印字された予診票) の記入
- ご質問がある場合は接種前日の午前中までに受診してください(お薬手帳を持参)。当日の対応はできない場合があります。裏面もご覧ください。

### ワクチン接種の当日

当日は予約時間の15分前までにご来院ください

#### 持ち物

- 新型コロナワクチン接種の予診票 (追加接種用) (記入したものを切り外さずにもとの封筒に入れて持参)
- 健康保険証
- お薬手帳

#### 服装

- 肩を出しやすい服装(接種会場は男女混合)
- マスク着用

## 血をサラサラにする薬を飲まれている方へ

飲んでいるお薬によっては、出血すると止まりにくいことがあるので、  
予診票でお薬の種類をおたずねしています。

ワクチンを受けることはできますが、接種後の出血に注意が必要です。

### 接種（筋肉注射）にあたっての注意点



接種後は、2分間以上、しっかり押さえてください。

- ・腕が腫れる・しびれるなどの症状が出たら、医師にご相談ください。
- ・接種にあたって、お薬の休薬は必要ありません。

対象の  
お薬

### 抗凝固薬

不整脈、血栓症、心臓の手術後の方に処方されることが多いお薬です。

商品名	一般名
ワーファリン	ワルファリンカリウム
プラザキサ	ダビガトランエテキシラート
イグザレルト	リバーロキサバン
エリキュース	アピキサバン
リクシアナ	エドキサバントシル酸塩水和物

血をサラサラにする薬には、次のような薬もありますが、  
通常どおり接種を受けていただけます。

### 抗血小板薬など

動脈硬化、狭心症・心筋梗塞、脳梗塞後、下肢動脈閉塞症の方に処方されることが多いお薬です。

商品名	一般名	商品名	一般名
バイアスピリン	アスピリン	コンブラビン配合錠	アスピリン・クロピドグレル硫酸塩
パナルジン	チクロピジン塩酸塩	タケルダ配合錠	アスピリン・ランソプラゾール
プラビックス	クロピドグレル硫酸塩	エパデール	イコサペント酸エチル(EPA)
エフィエント	プラスグレル塩酸塩	ドルナー、プロサイリン	ベラプロストナトリウム
プレタール	シロスタゾール	アンプラーグ	サルポグレレート塩酸塩
バファリン	アスピリン・ダイアルミネート配合剤		
プリリント	チカグレロル		

など