

ワクチン接種時に日程の調整が必要な薬

【骨粗鬆症の薬】

1週間に1回注射	1ヶ月に1回注射	6ヶ月に1回注射
テリボン	イベニティ、ボンビバ	プラリア

- ◎予防接種と上記の薬剤が同日投与にならないようにする。
- ◎上記の薬剤が初回投与（予定）の場合は、予防接種を優先する。
予防接種の前後7日以内に上記薬剤を開始しない。

【関節リウマチとその関連疾患の薬】

《ステロイド、免疫調整薬》 上段は一般名、下段は薬品名

ステロイド薬	スルファサラゾピリン	タクロリムス	ブシラミン	アプレミラスト
プレドニンなど	アザルフィジン	プログラフ	リマチル	オテズラ

- ◎予防接種の当日も、いつも通り内服する。

《免疫抑制剤》 上段は一般名、下段は薬品名

メトトレキサート (1週間に1~2回内服)	葉酸 (メトトレキサートの翌日または翌々日に内服)
リウマトレックスなど	フォリアミンなど

- ◎予防接種当日から7日以内の分は休薬が必要。接種前日までは内服可。
- ◎メトトレキサートの翌日もしくは翌々日内服予定の葉酸も休薬する。

JAK 阻害薬 (1日1回もしくは2回内服)

薬品名：ゼルヤンツ、スマイラフ、オルミエント、リンヴォック

- ◎予防接種当日から7日以内の分は休薬が必要。接種前日までは内服可。

《生物学的製剤》

1週間に1回注射	2週間に1回注射	4週間に1回注射
エンブレル エタネルセプト BS オレンシア (皮下注射)	ヒュミラ アダリムマブ BS シムジア アクテムラ、ケブザラ	シンポニー オレンシア (点滴) トルツ (乾癬性関節炎)

- ※患者によって用法用量が異なるので、必ずしも上記の投与間隔ではないことに注意。
- ◎オレンシア以外の注射製剤は、予防接種と同日投与にならないようにする。
- ◎オレンシア (皮下注射) の場合は、予防接種当日から前後7日以内の分は休薬。
- ◎オレンシア (点滴) の場合は、オレンシア点滴の14日後以降に予防接種し、その14日後以降にオレンシアの点滴を行なう。

【参考資料：米国リウマチ学会のガイダンス Arthritis & Rheum, July 2021, 1093-1107】

2021. 10. 26 作成、2022. 1. 13 改訂

小倉整形外科